



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19 ТРЕБУЕТСЯ ДВЕ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ

- ПЕРВОЕ ВВЕДЕНИЕ
- ВТОРОЕ ВВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ



ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ - ЭТО НОРМАЛЬНО!

- КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
- СЛАБОСТЬ
- БОЛЬ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ
- ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА
- ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ
- СЫПЬ
- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
- ПРИПУХЛОСТЬ В МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ

ТАКИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОГО ЭТАПА ВАКЦИНАЦИИ

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 НАДО ПРОДОЛЖАТЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

НОСИТЬ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ЧАЩЕ МЫТЬ РУКИ И СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

ВАЖНО! ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ НЕВОЗМОЖНО ЗАБОЛЕТЬ COVID-19

НИ В ОДНОЙ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ COVID-19, РАЗРАБОТАННОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖИВОЙ ВИРУС, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЗАБОЛЕВАНИЕ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ:

- ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
- ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ К КОМПОНЕНТАМ ВАКЦИНЫ
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ЛАКТАЦИЯ
- ТЯЖЕЛЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ МЕНЕЕ 30% НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ



СПУТНИК V (“ГАМ-КОВИД-ВАК”)

КТО РАЗРАБОТАЛ

НИЦ ИМ. Н.Ф.ГАМАЛЕИ

КАК ДЕЙСТВУЕТ

**НА ОСНОВЕ АДЕНОВИРУСА И
ГЕНА БЕЛКА SARS-COV-2**
ВИРУС ДОСТАВЛЯЕТ В КЛЕТКУ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, НО
НЕ МОЖЕТ РАЗМНОЖАТЬСЯ,
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗМ
НАЧИНАЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ
АНТИТЕЛА

КАК ВВОДИТЬ

ДВУХКРАТНО, С ИНТЕРВАЛОМ
В 21 ДЕНЬ

**КОГДА
СФОРМИРУЕТСЯ
УСТОЙЧИВЫЙ
ИММУНИТЕТ**

ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ ПОСЛЕ
ВТОРОЙ ПРИВИВКИ

ЗАБОЛЕТЬ COVID-19 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВАКЦИН НЕВОЗМОЖНО